

本草求真

本草求真卷一 第一册

生... 補... 滋... 溫... 腎...

補類

溫中 平補 補火 滋水 溫腎

溫中 人身一小天地耳 天地不外陰陽五行以為  
賦無偏則水以附火 火以生水 水人既足則氣血  
得資而無虧 缺不平之憾矣 惟其稟有不同賦有  
各異 則或水衰而致血有所虧 火衰而致氣有所  
虧 故必假以培補 俾偏者不偏 而氣血水火自補  
安養而無病矣 第其病有淺深 症有輕重 則於補  
劑之中 又當分其氣味 以求底於臨症 免惑如補  
之有宜於先天真火者 其藥必燥 必裂 是為補火  
之味 補有宜於先天真水者 其藥必滋 必潤 是為

滋水之味。補有宜於水火之中。而不敢用。偏勝之味者。其藥必溫。必潤。是為溫腎之味。補有宜於氣血之中。而不敢用。一偏之藥者。其藥必甘。必澀。是為平補之味。各是諸補之藥者。其藥必平。必淡。是為平補之味。而不敢用。以分則於補劑之義。已得其概。又何必過為分別。云。又按萬物惟溫則生。故補以溫為正也。萬物以土為母。甘屬土。故補又以甘為貴也。土虧則物無所載。故補脾氣之缺陷。無有過於白朮。補肝氣之虛損。無有過於雞內。補肺氣之痿弱。無有過於參耆。補心血之缺欠。無有過於當歸。是皆得味之甘而不失其補味之正也。其次補脾之味。則有如牛。因大藥倍精。蜂窠能服。荔枝。鯉魚。竹。屬甘。溫氣。雖較與白朮稍純。然蜂窠。鯉魚。竹。屬甘。溫氣。雖眼則兼補心。以安神。荔枝。則兼補脾。以益血。惟有牛。肉則能補脾。以固中。大棗則能補脾。以助胃。魚。魚則能補土。以制水也。且續膏。即補脾。以思其上。之。卑。鹽。而不平者。不得不藉白朮。以為培補。若使

土乾而燥能無滋而潤乎是有宜於山藥入乳黃  
 精指肉之屬是也土濕而凝能無燥而爽乎是有  
 宜於白朮砂仁之屬是也土潤而滑能無滯而固  
 乎是有宜於蓮子芡實肉蔻之屬是也土滯而結  
 能無味而醒乎是有宜於木香甘松藿香茵陳胡  
 荻大蒜之屬是也土凝而傾能無滲而利乎是有  
 宜於茯苓芡豆山藥鮑魚之屬是也土鬱而蒸能  
 無清而利乎是有宜於薏苡仁木瓜白蘚皮蚯蚓  
 紫貝皂白二礬消隆郁李之屬是也土寒而凍能  
 無溫而散乎是有宜於乾薑附子之屬是也土敦  
 而阜能無通而泄乎是有宜於硝黃枳實之屬是  
 也土崩而解能無升而舉乎是有宜於參耆甘草  
 之屬是也凡此皆屬補劑之味  
 然終不若甘溫補脾之為正耳

人參

山草

人參

補人肺性寒中氣不寒不燥形狀似人氣虛

本草能刺肺中元氣於垂絕之鄉張楚明曰人能回陽氣於垂

絕却虛邪於俄頃功與天地並行不悖是猶聖帝御世撫

育萬民參贊位育功與天地並立為參此參之義

所由起而參之冬所由立也李時珍曰人參年深浸漸長成者根如人

形有神故謂之人參神草參字從參亦浸漸之義參字後世因字文繁遂以參另字代從簡便

爾續按其第世畏乎其參者每以參為助火助氣

凡遇傷寒發熱及勞役內傷發熱等症外感皆自

惟察脉見浮數有力為外熱沉大有力為內熱脉

而沉細有力為實脉而浮大無力為虛熱而脉盛

為傷熱為實熱而脉虛為傷暑為虛熱而能言有

力者為定熱而懶言無力者為虛熱而口乾酷飲

冷水者屬實熱而口乾微飲湯者屬虛熱而久按不熱是裡陽乎  
 蓋熱是裡熱微表為實熱而久按不熱是裡陽乎  
 表為虛熱而火烙時常不減頭足身體一樣為實  
 熱而乍作乍止頭熱不烙足冷為虛熱而無汗二  
 便閉塞為實熱而有汗二便通調為虛熱而見有  
 裡症為裡熱熱而見有表症為表熱熱而時常秋  
 冬收飲閉藏多實熱而時常春夏升發浮散多虛  
 〇畏之不啻鳩游以為內  
 既發熱復以助火助熱之藥入而投之不更使熱  
 益甚乎詎知參以補虛非以填實其在外感正氣  
 堅強參與者木附桂同投誠為助火彌熾若使元  
 氣素虛邪匪不出正宜用參傾佐如古參蘊飲散  
 毒散小柴胡湯白虎加人參湯石膏竹葉湯黃龍

湯皆用人參內入傾邪外出喻嘉言曰傷寒宜辨  
益人受外感之邪必先汗以驅之惟元氣壯者外  
邪始乘藥勢以出若素弱之人藥雖外行氣從中  
傾輒者牛出不出重者反隨元氣縮入發熱無休  
矣所以體虛之人必用人參三五七分入表藥中  
少助元氣以為導邪之主使邪氣得矧有並非外  
藥一湯而出全非補養衰弱之意也  
感止因勞役發熱而可置參而不用乎夫參之所  
以能益人者以其力能補虛耳果其虛而短氣虛  
而泄瀉虛而驚恐虛而倦怠虛而自汗虛而眩暈  
虛而飽悶食滯等症固當用參填補即使虛而嗽  
血虛而淋閉虛而下血夫血與夫虛而喘渴煩燥

口渴便結等症，又何可不以虛治而不用以參乎？  
况書有云：參同升麻，則可以瀉肺火；同茯苓，則可  
以瀉腎火；同麥冬，則可以生脈；同黃耆、甘草，則可  
以退熱。出元是參更爲瀉火之劑，則參曷爲不用？  
惟在虛實二字，早於平昔分辨，明確則用，自不見  
悞耳。治痲潔古謂其喘嗽不用以共痰實氣壅之  
故。若使腎虛氣短喘促，豈能禁而不用乎？仲景謂  
其肺寒而嗽，勿用以其寒；東熱邪壅滯在肺之故，  
若使自汗惡寒而嗽，豈能禁而不用乎？東垣謂其



久病鬱熱在肺勿用以其火鬱於內不宜用補之  
 故若使肺虛火旺氣短汗出豈能禁而不用乎丹  
 溪謂其諸痛不宜驟用以其邪氣方銳不可用補  
 之故若使裡虛吐利及久病胃弱與虛痛喜按之  
 類豈可禁而不用乎節齋謂其陰虛火旺吐血勿  
 川以其血虛火亢之故若使自汗氣短肢寒脉虛  
 豈可禁而不用乎夫虛實二字最宜相較言問曰凡人身面  
 白面黃而青蓋悍者皆脾肺腎氣不足可用也面  
 赤面黑者氣壯神強不可用也脉之浮而濡虛  
 大遲緩無力沉而遲滑弱細結代無力者皆虛而  
 不足可用也若強長堅實滑數有力者皆火鬱內

實不可果其氣衰火熄則參雖同附桂可投如其  
 用也。火旺氣促則參即同知相切忌。至於陰氣稱虛陽  
 氣更弱陰不受火薰蒸者則可用參為君。陰氣稍  
 衰陽氣更弱而火稍見其盛者則可用參為佐。益  
 陽有生陰之功。陰無益陽之理。參雖號為補陽助  
 氣而亦可以滋陰生血耳。是以古人補血用以四  
 物而必兼參同用者。義實基此。宋曰：古人血脫者  
 益氣蓋血不自生  
 須得生陽氣之藥乃生陽生則陰長血乃旺也。若  
 單用補血藥血無出而生矣。素問言無陽則陰無  
 以生。無陰則陽無以化。故補氣非若黃耆性寒純  
 須用人參。血虛者亦須用之。

本草求真 卷一 補中 人參

<p>熱自汗 陽得固 多夢紛 紜 神氣補 而嘔噦 反胃虛 咳</p>	<p>而脈自 至破積 消痰 氣旺則 水可利 而痰自 消發</p>	<p>隨氣以 行破積 消痰 氣運則 食自化 而痰可 破</p>	<p>渴除煩 氣補則 火不浮 而煩自 除通經 生脈則 氣補</p>	<p>明日開 心益智 添精助 神定驚 止悸 正氣得 補解</p>	<p>兼治風 濕仍非 肺分氣 榮耳故 書載參 益土生 金</p>	<p>甘平雖 能補中 益氣而 質潤味 淡且能 潤肺止 嗽</p>	<p>治腎經 無根之 火攻於 咽喉不 能於氣 有益萆 薢</p>	<p>功當渴 肺而補 絕少玄 參苦鹹 寒滑色 黑入腎 止</p>	<p>陽陰氣 絕少而 於火盛 血燥不 宜沙參 甘淡性 寒</p>
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

喘促氣補而肺久病滑泄氣補而清淋瀝脹滿補氣

下降得中中風氣補而邪一切氣虛血損之症

氣補而血皆所必用至云參畏麋脂而亦有參同

用以治月閉是畏而不畏也參惡皂莢而亦有參

同用以名交泰丸是惡而不惡也參反藜蘆而亦

有參同用以取涌越是蓋借此以激其怒雖反而

不反也然非深於醫者不能以知其與耳出言但

參本溫積溫亦能成熟故陰虛火亢咳嗽喘逆者

為切忌焉參以黃潤緊實似人者佳上黨雖為

產道地。然民久置不採。時珍曰：上黨今潞州也。民以人參為地坊，皆不復採。

取今所用者，皆是遼參。今有所云黨參者，皆是假物。時珍曰：偽者皆

以沙參、薺、薺、桔梗、採根造作亂之。沙參體虛無心而味淡，薺、薺、體虛無心，桔梗體堅有心而味苦。人

參體實而味甘，微帶苦。其次百濟所出，力薄。上黨又其次。高

麗、遼東所出，力薄。百濟、川皆忌鐵。久留經年，須用

淋過，灶灰曬乾。及或炒米同參，納入蒸器，收藏。參

鬚性注下泄，與紫菀、當歸之尾，破血。意義相同。消

脫則忌。參、薺功主上涌，氣虛、火炎亦忌。但體虛、痰

壅，用之可代瓜蒂。山西太行新出黨參，其性止能

清肺並無補益與於久經封禁真正之黨參絕不  
相同另有義詳黨參論內所當並考參觀

黃者

山草

黃耆

專入肺  
兼入脾

味甘性溫質輕皮黃肉白故能入肺

補氣入表實衛為補氣諸藥之最是以有耆之稱  
且著其功曰生肌則能固表無汗能發有汗能收  
是引指其表實則邪可逐故見無汗能發表固則  
氣不外洩故見有汗能止耳又著其功曰熟則生  
血生肌排膿內托是若指其氣足則血與肉皆生

辨化膿成而為癰瘍聖藥矣至於痘毒不起陽虛

無熱楊曰保元湯用黃芪原出東垣治慢驚土裏

外護衛氣助陰陽作公胎本其証雖異其理則

同故去白芍加生薑破名曰保元湯多黃耆三錢

人參二錢炙甘草一錢書言於者最宜皆是取其

生薑一片水煎服之質輕達表功專實衛色黃人脾色白人肺而能升

氣於表又言力能補腎以治崩帶淋濁是蓋取其

補中升氣則腎受陰而崩帶淋濁自止然與人參

比較則參氣味甘平陽兼有陰者則秉性純陽而

陰氣絕少蓋一宜於中虛而泄瀉痞滿倦怠可除

一更宜於表虛而自汗亡陽遺精不起可治且一  
宜於水虧而氣不得宣發一更宜於火衰而氣不  
得上達之為異耳黃耆書言性畏防風其功益大  
蓋謂能以助者達表相畏而更相使是以如斯若  
使陽盛陰虛上焦熱甚下焦虛寒肝氣不和肺脈  
洪大者則並戒其勿用矣出山西黎民大而肥潤  
箭並良瘦小色黑堅硬不軟者服之令人胸滿震  
日宜服三  
拘湯以酒  
沃為使惡  
甲白蘇皮  
反葛藟畏  
五  
靈脂防風  
血虛肺燥  
肺痿表生  
用氣虛肺



寒酒炒，腎虛氣薄，益湯蒸潤，切片用。

當歸

三  
芳草

當歸入心，辛甘溫潤，諸書載為入心生血上品，緣

脈為血府，諸脈皆屬於心，心無血養則脈不通，血

無氣附則血滯而不行，當歸氣味辛甘，既不慮其

過散，復不慮其過緩，得其溫中之潤，陰中之陽，故

能通心而血生，號為血中氣藥，故凡一切血症，除

虛陽無所附而見血枯、血燥、血閉、血脫等症，則

用此法，治按當歸頭則止血，上行身則養血，中法

尾則破血下流全則活血不走出東古方合白芍

芍藥地黃同用名爲四物湯總劑益謂得芍以爲

長養生發之機地黃以爲滋補化源之自白芍以

爲救陰斂陽之本則血始能以生張景岳曰治血

四物爲主然亦有宜與不宜者蓋補血行血無如

高歸但當歸之性動而滑凡因火動血者忌之因

火而嗽因濕而滑者皆忌之行血散血無如川芎

然川芎之性升而散凡火帶血上者忌之氣虛多

汗火不歸元者皆忌之生血涼血無如生地黃血

清血無如芍藥然二物皆涼凡陽虛者非宜也脾

弱者非宜也麻明身涼多嘔便溏者皆非若血虛

而氣不同則當佐以人參黃耆血熱佐以桑寄生

連血積佐以大黃。瘵牛與夫營虛而表不解則當  
佐以柴葛麻桂衛熱而表不斂則當佐以大黃。寤  
其病之所向以爲出入加減。要使血滯能通血虛  
能補血枯能潤血亂能撫俾血與氣附氣與血固  
而不致散亂而無所歸耳。書命其名曰歸卽是此  
意。是以氣逆而見欬逆上聞者則當用此以和血  
血和而氣則降矣。寒鬱而見瘧痢腰腹頭痛者則  
當用此以散寒。寒散而血則和矣。血虛而見風痿  
無汗者則當用此以養血。血養而風則散矣。他如

瘡瘍癰疽而見痛苦異常，肌肉失養，而見皮膚不

潤，並衝脈為病，而見氣逆裡急，帶脈為病，而見腹

痛，腰如坐水。衝脈起於腎下，出於氣街，俠臍上行，

入足，灌諸絡，為十二經脈之海，主血。亦何莫不因

血虛，氣無所附之意，得此則排膿止痛，止癰消毒，去

膚澤皮潤，而無枯槁不榮之患矣。然此味辛，則散

氣，虛火盛者，切忌。味甘，則寒脾胃，虛寒者，則忌。體

潤性滑，大腸泄瀉者，則忌。不可不熟晰而明辨耳。

至書既言當歸入心，而又曰入肝入脾，無非因其

血補而肝與脾皆有統藏之意。肝統血脾統血秦產秦州  
所頭圓尾多色紫氣香肥潤名馬尾馬尾嘗歸其性力  
柔善補川產尾粗堅枯名饒頭當歸其性力剛容  
攻只宜發散收貯晒乾乘熱紙封囊內用宜酒洗  
畏蒼蒲海藻生薑惡濕麩

白朮

山草 四

白朮

人

緣何專補脾氣蒸以脾苦濕急食苦以

燥之脾欲緩急食甘以緩之

內經

白朮味苦而甘既

能燥濕實脾復能緩脾生

滋燥則脾實且其性

能燥濕實脾復能緩脾生

最溫服則能以健食消穀為脾臟補氣第一要藥  
 也。五臟各有陰陽。白朮書言無汗能發有汗能收。  
 遊滯止泄消痰治腫止熱化癍安胎。胎氣繫於脾  
 所附。故止嘔。辟物俱有為嘔有物無聲為吐東垣  
 易著。天牛其皆可以治表實氣壅若  
 虛嘔。穀氣不行。當以參。功効甚多。摠因脾濕則汗  
 木補胃。推揚穀氣而已。  
 不止。脾健則汗易發。凡水濕諸邪。虛不因其脾健  
 而自除。吐瀉及胎不安。胃之上口為貴門。水穀於  
 水穀之滓穢。自此而入。小腸又自。小腸下。一十六  
 曲。水穀始下。小腸下口。關門。水穀自此。泌別。居  
 為滲。入於大腸。水之清。入於膀胱。如水穀不分。於  
 瀉。不別。則皆入於大腸。而成。卒上。於天。脾土。運。於

本草求原 卷一 濕中白朮 十一

自能勝過無濕則不滯  
虛不能制濕則風寒與熱皆得于而為病  
亦勝

不因其脾健而悉不矣故同枳積則能治痞積

考則能安胎同澤瀉則能利水同乾薑桂心則能

消飲祛癖同地黃為丸則能以治血瀉萎黃同

夏丁香薷汁則可以治小兒久瀉同牡蠣石斛

蒸則可以治脾虛盜汗然血燥無濕腎間動氣

築燥瀉便閉者忌服謂其燥腎閉氣則其氣益

劉涓子云癰疽忌白朮以其燥腎而閉氣故反生

膿作痛也凡服枳積除世人但知白朮能健脾胃

用枳積而無濕邪者用之反燥脾家津液是損

脾陰也何補之有哉最易誤故特表而出之

寒濕過甚水滯中宮者亦忌謂其水氣未決若不

勝水甘徒滋壅必待腎陽倍補水氣漸消腎氣安

位木始可投獨洪水衝堤必待水此又不得不精

變換於其中也正土虧水泛必俟水勢蓋補脾藥

不一白木專補脾陽除邪之功勝而益陰之效

故病屬陰虛血少精不足內熱骨蒸口乾唇燥嗽吐痰吐血鼻衄齒齩便秘滯下者法咸忌之

生則較熱性更鮮補不滯膩能治風寒濕痺及散

腰臍間血并衝脈為病逆氣裡急之功非若山藥

止補脾臟之陰甘草止緩脾中之氣而不散於上



下俾血可生燥症全無蒼朮氣味過裂散多於補

人參一味沖和燥氣悉化補脾而更補肺所當分

別而異視者也出浙江於潛地者為於潛朮最佳

水用浸借穀氣燒土拌炒借土氣入膏燥藥蜜水

炒借潤入滋陰藥人乳拌用借乳入消脹藥麩

皮拌炒用借熱

龍眼五葉

龍眼補人氣味甘溫多有似於大棗但此甘味更

重潤氣尤多於補氣之中溫則又更有補血之

九補則故書載能益脾長智脾益則養心葆血葆血

驚悸驚悸腎腸風下血便血症不一端然大要血清而

如倫其腹不痛是為腸風無疑便血而見腹痛則

則為積毒下注血而見鮮紅為熱痰淡為寒瘵

與夫症見面色痿黃大便不實聲短氣息強心吃

失所統陰不隨便機為實而完不越氣俱可用此

為治益血雖屬心生而亦賴脾以統思慮而氣既

精則非甘者不能以補思慮而神更損則非潤者

本草求真 卷一 瀉中 補劑

不能以游龍眼甘潤兼有既能補脾固氣復能保  
血不耗則神氣自爾長養而無驚悸健忘之病矣  
按古歸脾湯有用龍眼肉以治心脾傷損義實甚  
甘潤和柔以至於極之妙也至書有言久服令人  
輕身不老百邪俱辟此是神經長養之謂也蓋毒可  
除三蟲可殺止是氣血充足而蟲不食之謂也此  
味甘體潤凡中滿氣壅腸滑泄利爲大忌耳桂產  
者佳粵東者性熱不堪入藥

大棗

五藥六

大棗

味甘入脾

味甘氣溫。色赤肉潤。為補脾胃要藥。經

曰。裡不足者。以甘補之。形不足者。溫之以氣。大棗

甘能補中。溫能益氣。脾胃既補。則十二經脈自通。

九腹利。

九腹。口耳鼻。目前後二陰。

四肢和也。正氣足。則神自安。

故凡心腹邪氣。心下懸急者。得此則調。得補則氣

力強。腸胃清。身中不足。及病見腸澀者。用此則安。

甘能解毒。故於百藥中。得甘則協。且於補藥中。風

寒發散。內用為向導。則能於脾助其升發之氣。

仲景

治奔豚用大棗滋土以平腎，給不似白木性燥，不  
水飲腸痛用十棗，益土以勝水。不燥，專於脾陰有益  
潤。備於脾氣則補。山藥性平不燥，專於脾陰有益  
之為異耳。但多食損齒。齒精腎土及氣實中滿切  
忌。甘令中滿。大建中湯北產肥潤者良。金華南棗  
亦佳。殺烏附忌慈魚同食。

荔枝

菓 七

荔枝

入脾

味甘而酸，氣溫，故能入脾助氣。

甘入

肝疏血養營。

入

然於血虛火衰則宜。若使病非

虛弱及素火盛服之，反致助火發熱而有衄血。

入勝

入勝

入勝

入勝

入勝

入勝

入勝

入勝

入勝

入勝

入勝

入勝

入勝

入勝

入勝

入勝

入勝

痛之筋夾者食委即腫口痛或切血也病齒

及火病人尤忌之開寶本草言其性平蘇氏謂多

食無傷皆誤說也按物類相感志云食荔枝多則

醉以澁浸水飲之即解此即食至核味甘氣溫專

物不清運以木屑清之之意

入肝腎散滯碎寒雙核形似翠丸尤治頑油卵腫

以其形類相似有感而通之義也治疔氣如汁用

香青皮各炒為末用酒送下痘瘡不起用殼煎湯以服蓋取殼

性溫補內托之意然要皆屬性燥用當酌症所宜

非若龍眼性主溫和而資益甚多也川建產者良

節糖造糖

造糖

造糖

造糖

造糖

造糖

本草求真 卷一 濕中荔枝節糖 十一

飴糖脾入氣味甘溫據書言能補脾潤肺化痰止

嗽並仲景建中湯用此以為補中緩脾蓋以米麥

本屬脾胃之穀而飴糖即屬穀麥所造凡脾虛而

肺不潤者用此氣味甘緩以補脾氣之不足成無

脾欲緩急食甘以緩之兼因甘潤以制肺燥之有

餘是以脾虛而痰不化固可用此以除痰脾虛而

嗽不止固可用此以除嗽即中虛而邪不解亦得

用此以發表中虛而煩渴時時亦得用此以除煩

止渴寒食大寒一升水七升煎五他如草烏毒中

新編

其性橫裂固可用此以為甘緩世刺誤吞痛楚異  
常更可用此以為柔軟然糖經煉成濕而且熱其  
在氣虛痰盛中虛火發固可用此溫除若使中滯  
氣逆實火實痰非惟治痰且更動痰非惟治火且  
更生火震亨曰即糖屬上而成於火火發濕中至  
之熱老氏謂其動風言水而避本矣至  
於小兒多食尤易損齒生齲齲言水而避本矣不可  
不慎率白者不入藥用

鷄肉

原食九

鷄肉肝入

補虛溫中載之本經不為不是然鷄屬



異而動風與生外應乎水丙通乎肝得陽氣之具

早拔先竅而鳴宗與曰鳴於五頁日鳴必鼓翅

火動風生之象時珍曰禮記云天產作揚地產作

附精宜風木是陽中之陰也故風火易動而易

散人之陽事不力者不宜食鷄是以昔人有利婦

人不利男子之說而東南之人肝氣易動則生火

生痰病邪得之為有助也故陰虛火盛者不宜食

鷄食則風火益助矣脾胃虛弱者不宜食鷄食則

肝邪益甚而邪甚敗矣味者不察既犯陰虛火動

脾虛不食兩症又不樽節口與反執補虛溫中之  
說殊為可惜至於婦人小產胎動尤不宜食食則

蓋動而血益損惟惟有鳥骨一雞別是一種獨得蓋虛而胎益墮

水木之精性端走肝腎血分補血益陰為補虛除

癆祛熱生津止渴及下痢噤口帶下崩中要藥珍

日鳥色屬木兆象屬陰故鳥鷓如古方有用鳥骨

所治皆血分之病各從其類也鷓取其補如古方有用鳥骨

鷓鷓以治婦人百病取其補鬼擊卒死用熱血以

塗心下即甦肝後用鳥鷓冠血源口中令甦仍鷓

冠位處至高精華所聚凡年久雄鷓色赤尤為陽

氣充盛。故可刺血以治中惡驚悸。陰不及或中風

口眼喎斜。用血塗其頰上即正。賦能走血透雞血

和酒調服。可以痘即發。對口毒瘡。可用血塗。即散

風勢。若行中蜈蚣。赤舌服。出口。可用冠血浸舌。并

咽即消。畏惡而得制伏。其效甚眾。至於雄鷄肝味

甘微苦而溫。何書載治陰痿不起。三具唯兔絲子

一物為末。卵雀和丸。如小豆大。每服五六十九酒下。及小兒疳積。眼目不明

並肝經實熱。虛熱。實熱用雄鷄肝並切黃連白

用鷄肝同明雄黃。桑白皮。皆以取其肝以入肝。鷄肉金為末酒蒸去藥食

類相感之意。鷄屎白性寒不濕。用之以治鼓脹。普

方云。治鼓脹。且食不能。非食由脾虛不能。制水

而勝土。水穀不運。氣不宜。清故令中消。其府所

熱精氣。不得滲入。膀胱別走於腑。溢於皮裡。膜外

故成脹。澹小便短。滿。鷄矢性寒。利小便。誠萬金不

斗。瀆七日。用服。三錢。亦可。石淋。古今。強錄。用鷄矢白

三。或為末。服二錢。亦可。石淋。古今。強錄。用鷄矢白

以酸漿。飲。方寸匙。瘰癧。外。塗。以。猪。脂。三。升。何。烏

日。二。次。當。下。石。出。瘰。癧。外。塗。以。猪。脂。三。升。何。烏

止。當。儲。各。一。兩。前。十。湯。去。風。痺。鷄。矢。一。升。炒。黃。為

末。知。葉。盛。漬。三。升。酒。亦。以。取。其。消。導。利。濕。清。熱。除

風之義。惟鷄子性。稟。生。化。最。初。之。氣。兼。清。濁。而。為

本草求真 卷一 瀉中鷄矢 五十五

體味甘氣寒性專除熱療火為風熱痢瘕及傷寒

少陰咽痛必用之藥卵清微寒性專治熱解毒為

目痛赤痛煩滿欬逆小兒下洩婦人難產胞衣不

出癰疽激腫必用之藥卵黃微溫性滑利產安胎

但多食則滯問曰勿多食令人腹中有聲動風氣

共蟹肉食掛人共懶肉食成通凡同兔肉食成洩

病如婦以鷄子配魚同食令兒生瘡同糯米食令

兒生他如卵殼研末磨障除翳及或敷下疳瘡益

以取其蛻脫之義傷寒勞復用此散令黃黑為末

熱湯調服亦以取其風性發散之意胞內黃皮性

卵黃

卵清

卵殼

能消穀除熱止煩通溺並卵中白皮能散久瘕積  
氣皆以取其性氣上行下入之妙然要鷄中具有  
溫性則能助火助風具有寒性則能清熱利濕具  
有不性則能益陰秘陽用燬而在於肝則可通肝  
以治疝用鷄而在於脾於屎則可入膈以消食用  
鷄而在於抱出皮燬則可入目以磨翳而仍不燬  
乎巽木風動以為之主故能益入厥陰而不收其  
北血虛筋掣及陰虛火起骨蒸服此大忌請鷄惟  
烏骨烏肉白毛最良

牛肉

畜

牛肉

脾

木屬土若屬黃牛色猶得正液能補土

固中

上居

益氣止渴

氣逆則止

功與黃者無異

三癰久病日服黃牛湯能令日漸輕強而無腫脹

之病其效可知即丹溪倒倉法治停痰積血膠聚

於腸胃迴腸曲折之處發為癰痰癆瘵蠱脹膈膈

非九散所能及者用此因瀉為補借補為瀉踵其

曲折如洪水泛漲陳朽順流而下沉苛悉去大有

再造之功中年後行一二次亦却疾養壽之一助

朱慶字倒倉論曰腸胃為積穀之室故謂之倉倒  
 者推陳以致新也胃積血互相糾纏為癰瘻  
 五味有傷中宮停痰積血互相糾纏為癰瘻  
 癆為蟲脹成疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔  
 愈和自非丸散所能去也此方自出西塘吳人其  
 法用黃肥壯牛肉二十斤長流水煮成糜去滓  
 取液再熬成虎珀色取之每飲一鐘隨飲至數十  
 鐘寒月溫飲病在上則令吐在下則令利在中則  
 令吐而利在人活變吐則後湯即服其小便一二  
 確亦可蕩滌餘垢脾胃乃食淡粥養半月則精  
 神強健沈疔悉去也須斷此為補中之劑非苦汗  
 男牛半年牛肉五年而安  
 吐下藥能以傷人亦奇方也但病非腸胃者不得  
 避行是法牛有黃牛水牛之分故黃牛性溫而水  
 牛性平白水牛可治反胃吐食腸結不通牛乳味



甘微寒亦治脾胃枯槁噎膈反胃然膈形類甚多

下也日人膈斷損津竭氣逆不能入喉人膈而自

香煤膈痰疾未嘗不快然旋切旋生旋煤旋出痰

愈且盛津液見枯情道厭會無不阻塞雖水與飲

類可以入喉不逆而堅硬食物無至膠會即返日

一表一裏腎水既槁腸火偏勝與焚津液三陽熱

若前後閉塞口既不通必反於上直犯清道上衝

吸門咽喉所食多噎不下故經有言三陽結謂之

膈朱炭守日反日噎膈大便燥結宜牛乳羊乳煎

將煎之兼服四物湯為上策不可服牛肉狗肝

黑身白頭者切忌同指因食則生寸白蠶

鯽魚十一

補  
水  
清  
散

鯽魚入脾胃氣味甘溫。諸魚性多屬火。惟鯽魚則  
 性屬土。土能制水。故書載有和胃實腸行水之功。  
 凡腸風下血。膈氣吐食。俱可用此。投治。且性與厚  
 朴反。朴則泄氣。鯽則益氣也。至於生搗。可塗痰核。  
 乳癰。堅腫。以猪油煎灰服。可治腸癰。合赤小豆煮  
 汁食。則消水腫。炙油則治婦人陰瘡。同白礬燒研。  
 則治腸痼血痢。入絳礬泥固煨。則治反胃吐食。與  
 胡椒煨。則治疝氣痞滿。皆以仿其制水之意。但煨  
 不可去鱗。以鱗有止血之功也。烏背者味美。忌食。

本草求真 卷一 鯽魚鱗 二二

冬芥菜沙糖猪肝

蜂蜜

生

蜜入肺木花水精英春生露氣曬得醱而成

生則性涼清熱熟則性溫補中為至純至粹之味

凡人五臟不足燥結不解營衛不調三焦失職心

腹急痛肌肉瘠癆咳嗽熱疔眼目眩花形色枯槁

無不借其潤色以投如仲景治陽明燥結大便不

解用蜜煎導乘熱納取其能通結燥而不傷脾胃

也滋補藥俱用白蜜為丸取其和胃潤肺也臣於

本草綱目  
卷之八

蜂房  
蜂房  
蜂房

赤蜜食之使人心煩以其味酸者故惟降火藥用  
 之白蜜雖補脾肺然性涼質潤若脾氣不實腎氣  
 虛滑及濕熱痰滯胸痞不寬者咸須忌之白如膏  
 者良李時珍曰凡試蜜以燒紅火筋用銀石附每  
 蜜一觔入水四兩桑火慢熬掠去浮沫至滴水成  
 珠用忌葱蒜蕎苳同食蜂房味苦鹹辛氣平有毒  
 為清熱軟堅散結要藥是以驚癇蠱毒癰疽瘰癧  
 疔疔風毒等症得此則除時珍曰蜂房房陽明藥  
 之者亦皆取其以毒以其辛能散結苦能泄熱鹹  
 攻赤殺蠱之功耳

本草綱目  
卷之八  
蜂房  
二十二

能軟堅且取其氣類相從以毒攻毒之義也有同  
亂髮蛇皮三物合燒灰酒服治惡瘡附骨癰根在  
臟腑歷節腫出疔腫惡脈諸毒者又以煎水漱齒  
止風虫疼痛洗乳癰蜂疔惡瘡者皆以取其攻毒  
散邪殺虫之意并得陰露之寒及蛻脫之義耳但  
癰疽潰後禁用去外粗皮酒淨炒用

本草求真卷一 第二册

江西無所不有... 聖藥黃帝製訂

上海新學書局

平補不精不足而以重味投補是虧已在於精而補  
虧已在於氣而補亦不當用以平劑矣氣不足而以輕劑投補是  
而於血有損補而於氣有虛補上而於下有虧  
補下而於上有虧其症似虛非虛似實非實則不  
得不擇甘潤和平之劑以進如萎蕤人乳是補肺  
陰之至平者也山藥黃精羊肉猪肉甘藷是補脾  
陰之至平者也青子桑寄生蠔蚶狗脊是補腎  
之至平者也燕窩鶴肉鹿角是補精氣之至平者  
也但阿膠人乳則合用脾胃而皆潤合桑椹則合  
脾陰五臟而皆安山藥則合脾胃而皆潤合

本草求真

卷一 平補

三十三

則能補水以安心至於倉米補豆一能養胃以除  
煩一能舒脾以利胃皆為輕平最和之味餘則  
苦非辛兼淡不燥不火而氣  
味大雜不可概作不補論耳

萎蕤  
山草

萎蕤入肝脾腎一名玉竹味甘性平質潤據書載

能補肺陰及大肝脾腎以祛風濕與人參地黃稱

為補劑上品如本經所論以治中風暴熱等病別

中寒日痛背翹淚出所論以治心腹結氣虛熱腰痛並  
虛勞客熱頭痛不安千金以治風濕自汗身重

言難出時珍以治痿痺并云可以當參其說未  
乘不足皆以萎蕤為主

嘗不是但此氣平力薄既與人參力平不若復以

補虛  
其氣

地黃味濃不令卽使用至効許未有奇功較之人  
參之補元地黃之滋陰不啻天淵矣知可用此當  
參以挽垂絕之傾乎况書載云祛風除濕不無疎  
泄於補更云不及芴云可稱上劑耶肥白者良似  
黃精而差小黃白多鬚竹刀刮去皮節發散用生  
補劑用蜜水拌飯上蒸熟用

黃精

上四  
山草

黃精

崑人脾兼  
人肺腎

書極稱羨謂其氣平味甘治能補

中益五臟補脾胃潤心肺填精髓助筋骨除風濕



下三盤且得坤土之精粹久服不飢其言極是時  
日黃精受戊巳之淳氣故為真黃宮之勝品土者  
萬物之母土得其養則水火既濟木金交合而諸  
邪自去百病不生矣但其所述逃婢一事云其服此能飛不  
 無可疑究其黃精氣味止是入脾補陰若使挾有  
 痰濕則食反更助痰况此未經火煨食則喉舌皆  
 痺何至服能成仙若使事果屬實則人參更得夫  
 地中和之粹又曷云不克成仙耶細繹是情殊覺  
 謊謬因并記之根紫花黃蕪如竹葉者是俗名山  
 生蕪九蒸九晒用

甘草十五

山草

甘草

味甘

味甘性平質中外赤肉黃生寒熱苦

人言其有火能瀉是因火性急迫用此甘味以緩

火勢且取生用性寒以瀉熒燥害耳至書有云炙

用補脾是能緩其中氣不足調和諸藥不爭王好古曰

五味之用苦泄辛散酸收鹹軟甘上行而發而木

草言甘草下氣何也益味甘主中有升降浮沉可

上可下可外可內有和有緩有補有泄居中之道

盡矣張仲景附子理中湯用甘草恐其慢下也皆緩之意小柴

胡湯有柴胡黃芩之寒人參半夏之瀉而用甘草

者則有調和之意建中湯用甘草以補中而緩脾

急鳳髓用甘草以緩腎急而生元氣也乃甘補

本

之意故入和劑則補益入涼劑則瀉熱入汗劑則

解肌入峻劑則緩正氣入潤劑則養血并能解諸

藥如頌曰按孫思邈千金方論云甘草解百藥毒

之如反掌方稱大豆汁解百藥毒予每試及兒胎

虛以致尊為國老然使胃虛寒及或挾有水氣

脹滿等症服此最屬不宜未可云其補脾而凡脾

胃虛寒皆可得而服也若使滿屬虛致則甘又能

瀉滿不可不知王好古曰甘者合人中滿中滿者

也凡不滿而用炙甘草為之補若中滿而用生甘  
草為之瀉能引甘藥直至滿所甘味入脾歸其所

喜此凡降浮沉之理也經云以甘稍止莖中泄痛

補之以甘瀉之以日緩之是矣氣行於下節消癰疽燠腫及除胸熱節處功各有宜但

用宜取大而且結至書所載甘反大戟芫花甘遂

又云亦有並用不悖惟深達精微者始可知之占

治痰癖有用十棗湯加甘草東垣治結核與海藻同用丹溪治癆瘵蓮心飲與芫花同用皆以反其

下勢之貌

桑寄生十六

桑寄生高木入感桑精氣而生味苦而甘性平而和

不寒不熱號為補腎補血要劑絲野主骨髮生血

補肝  
除風  
潤骨

苦入腎腎得補則筋骨有力不致痠痺而酸痛效

甘補血血得補則髮受其滋陰而不枯脫落矣效

凡內而腰痛筋骨為疾胎墮外而金瘡肌膚風也

何一不藉此以為主治乎第出桑樹生者真須

速桑葉者乃可用和葉葉細剉陰乾忌火服則其效如神

若雜樹所出性氣不同懸反有害

柏子仁十一

香木

柏子仁出心辛甘平潤考書俱言四臟皆補兜之

止厲心藥耳益香雖能補脾而實可以通竅而大

扶國

心潤雖可以補肝而益腎而實可以寧神而定智  
 甘雖足以和胃而固中而實足以益血而神守是  
 以風濕可除驚癇可療邪熱可辟皮膚可澤惟見  
 神恬氣適耳聰目明而無枯槁燥寒之患矣然性  
 多潤滑凡作陰寒泄瀉者切忌氣多香洩體虛火  
 盛者亦忌昔云不飢不老延年輕身雖出經典仍  
 當活視毋為青執蒸熟茶乾白朮入藥炒研去酒

用畏菊花

冬青子十八木

冬青  
種山  
條  
條  
條

冬青

肝腎入

女貞樹骨載之本草已屬不同如冬青

即今俗呼凍青樹者女貞即今俗呼蠟樹者樹骨

即今俗呼猶兒刺者冬青女貞花繁子盛纍纍滿

樹冬月鸚鵡喜食木肌皆白葉厚而葉長綠色面

青背淡形色相似但女貞則葉長四五寸子黑色

冬青則葉微圓子紅色之為異耳今人不知女貞

即屬蠟樹僅以女貞茂盛呼為冬青致令兩物同

名枸骨樹若女貞肌白葉長青翠而厚葉有五刺

子若冬青辨心以致混將是物亦列女貞項下究

冬青

補腎  
藥

補腎  
藥

之三物合論在冬之甘而涼諸書雖言補肝強

筋補腎健骨筋集方冬至日取凍青樹子鹽酒浸

七十粒而補仍兼有清女貞氣味苦平按書稱

為補虛上品可以滋水黑髮如古方之用早進草

桑椹子同入以治虛損然亦須審脾氣堅厚稍涉

虛寒必致作泄枸杞氣味苦平按書有言能補腰

膝及治勞傷失血用枸杞數兩去刺入紅亦是補

水培精之味但性多陰不燥用以陰虛則宜而於

陽虛有碍枝葉可以淋汁煎膏以塗白癩風脂亦

本草求真 卷一平補冬青子

三十八



可以爲鴉粘者三藥氣味不同至就其子紅黑以  
推大約色紅則能入肝補血色黑則能入腎滋水  
色紅則能入血理血故於失血血瘀有效色黑則  
能補精化血故於烏髮黑髮有功然色紅而潤其  
性陰兼有陽色黑而潤其性純陰不雜故書有言  
女貞補中安臟而又議其陰樂至極凡此似同而  
異在人平昔細爲考核免至臨岐亡羊耳冬日採  
佳酒浸蒸潤晒乾用

合歡皮

十九  
喬木

積聚

合歡兼人心因何命名謂其服之臟腑安養令人

歡欣怡悅故以歡名第此味甘氣平服之雖能入

脾補陰朱震亨曰合歡屬土補陰之功長肌肉瀦筋骨推可見矣人心緩氣而

令五臟安和神氣自暢及單用煎湯而治肺癰唾

濁華甫獨行方合阿膠煎湯而治肺痿吐血皆驗與白

朮葵膏而為長肉生肌續筋接骨之藥然氣緩力

微用之非止錢許可以奏效故必重用久服方有

補益怡悅心志之効矣若使急病而求治即歡悅

其能之乎合歡即合昏木植於庭除幹似梧桐枝

本草求真 卷一 平補合歡皮

甚柔弱葉似皂角極細繁密葉則夜合者是也粗

皮炒用

陳倉米

二十造陳

陳倉米

揣入目兼入心脾

即米多年陳積於倉而未用者

也

時珍曰陳米北人多用粟南人多用粳及秈水浸蒸晒為之亦有大煮過治成者入倉陳必

皆氣過色變故古人謂之紅粟紅腐陳相因也

此米存積未久則性仍

質未壞煮汁則膠粘不爽食亦壅滯不消至於蒸

病將愈胃氣未復猶忌食物總屬熱與食鬱而煩

以生必得冲淡甘平以為調劑則胃乃適陳米泔

液既枯氣味亦變服此正能養胃除濕祛煩是以  
古人載此既有煮汁養胃之功復有祛濕除煩之  
力一切惡瘡百藥不效者用此作飯成團火煨存  
性麻油膩粉調敷可知冲淡和平力雖稍遜而功  
則大未可忽也若以無病之時而用此日為飽飯  
則又未見其有克合者矣

山藥

二十一  
藥骨

山藥

入肺入脾入腎

本屬食物古人用入湯劑謂其補

脾益氣

氣益出於陰補非正說也

除熱然究色白入肺味甘入

脾氣雖溫而却不為補脾肺之陰

吳珍曰接其後云山藥入手足

太陰二經補其不足清其虛熱是以能潤皮毛長肌肉與熱同食

不能益人

說曰惟和麩作不飽則不似黃者性溫動氣為不能製麩毒也

能補肺陽白朮苦燥能補脾陽也且其性清

游故治遺精泄瀉

而諸家俱未言消能治遺精不禁味甘兼鹹又能

益腎強陰故六味地黃丸用此以佐地黃然性雖

陰而滯不甚故能滲濕以止泄瀉生搗敷癰瘡消

腫硬亦是補陰退熱之意至云補陽消腫補氣除

滯理雖可通語法率混似非正說至入湯劑以治

補脾除

火虛危症難圖近功必多用之方愈以其秉性利  
緩故耳入滋陰藥中宜生用入補脾內宜妙黃用  
淮產色白而堅者良建產雖白不佳

扁豆 二十三

扁豆 人 如何補脾蓋緣脾喜甘扁豆得味之甘

故能於脾而有益也脾得養而能舒扁豆稟氣

芳故能於脾而克舒也脾苦濕而喜燥扁豆得性

之溫故能於脾而克燥也脾土既實則水道自通

三焦不混而太陰暑濕之邪 指太陰暑濕有 自爾克消矣

能復藏於脾而有滑瀉之病乎但多食壅滯  
不可不知子粗圓色白者佳入藥連皮炒研用亦  
有浸去皮及生用者

鴨肉 二十三 水禽

鴨肉 入脾胃 氣味甘溫 遇火而生 噴水而長 未

出卵時先得火氣故不憚冰雪偏喜涵雨而尾脾

膈濁最甚故羣雌一被其氣皆得化生之機不待

鷲尾之遍也溫中補虛扶陽利水 時珍曰鴨水禽也治水利小便

宜用青頭雄鴨 是其本性此主性溫者而言也

水木發生之象

有言其性微冷能入肺腎血分滋陰補虛除癆止

嗽化痰利水消腫為要烏可久治久虛發熱咳嗽

黑嘴白鴨一集取血入酒飲使人肺經以

酒補之將鴨乾持去毛腸去腸拭入大

煮肉二升參苓平胃散末一升縛定用沙兜一

置鴨在內以炭火慢煨將陳酒一瓶作三次入之

酒乾為度取起食服之陰虛亦不見燥陽虛亦

鴨及棗類作取食服之陰虛亦不見燥陽虛亦

見冷非其性平烏能若是乎但雌則微溫而雄則

微冷不可不辨若黑竹白毛者為虛癆聖藥亦金

水相生之義耳老者良血解全銀丹石硃霜百毒

及中惡溺死者卵甘鹹微寒能滋陰除心腹膈轉



炒鹽藏食佳

鴿肉

二十四  
原禽

鴿肉

肺腎入

味鹹氣平性稟金水故能入腎入肺為

久患虛羸要藥凡人肺腎受傷多緣精虧氣弱精

愈損者則氣益祛氣愈祛者則精益虛

精無氣不  
行氣無精

不附服此味鹹溫平則精既見其有補而氣益見其

有益也此為甘平溫鹹之品其性不涼不燥故於

治虛之外更能兼理瘡疥

新嘉  
凡一切皮膚惡瘡及

癩風瘰癧湯風等症煮熱酒服無不成宜并辟諸

醫考  
本草  
卷之

般藥誠虛癆患疥之良劑補精與氣之要藥也

但鴿形色甚多除珍目鴿林活惟白者最良射能

預解痘毒用白鴿卵一對人竹筒封無刺中半月

龍三五飲下棄尿亦能殺瘰癧虛癆家咸多畜之

阿膠 二十五

阿膠崑入肝菽味甘氣平質潤專入肝經養血何

書又言除風化痰益以血因熱燥則風自生阿膠

得阿井純陰之濟水又得純黑補陰之鱗皮宗與

皮煎膠取其發散皮膚之外也用烏者取烏色屬

本草求真 卷一 平補仙肉阿膠 三十三

氣味俱陰既入肝經養血復入腎經滋水水補而

熱自制故風自爾不生藏器曰諸膠皆主風止洩

又膠潤而不燥膠性既能潤肺復能趨下降濁使

痰不致上逆耳至於痔漏瘍風血血淋下痢因

成熱燮經枯崩帶胎動癰腫治克有效亦是因血枯

燥伏熱而成故能得滋而解此為血分養血潤燥

養肺除熱要劑不似首烏功端入肝補血祛風烏

鬚黑髮而於肺經潤燥定喘則未及鹿膠性偏濕

督與衝以益其血而於肺經清熱止嗽則未有

膠力補至陰通達於任澁熱除蒸而於陰中之味  
 未克有補古人云阿膠養神人參益氣正謂此也  
 以黑光帶綠至憂不軟者其削炒成珠或麩炒蛤  
 粉炒去痰蒲黃炒止血或酒化水化為用以山藥為使  
 惡大黃牛膠功與阿膠相似陳白明云補虛用牛  
 皮膠去風用皮膠  
 時珍云阿膠難得真牛皮膠亦可備用其性味皆  
 平補宜於虛熱若鹿角膠則性味熱補非虛熱者  
 所宜不可治能養血祛風然總不如阿膠養血治  
 不詳辨也風之為最耳

羊角 二十六

南

羊肉入氣味甘溫東垣載能補形此一句已盡

羊肉大概矣復於十劑方中又云補可去弱人參

羊肉之屬是明指參補氣而補形端在羊肉又何

疑哉夫氣屬陽血屬陰體輕而燥者屬陽體重而

潤者屬陰羊肉氣味雖溫然體潤肉肥其於肌膚

血液則易及時珍曰凡味甘者皆補血虛若使泥於書載壯陽

補氣健力等說及以陽生陰長之理牽引混指其

何以清眉目而別治用哉况據書載羊肝羊膽皆

指屬寒而能明目以祛翳時珍曰肝開於目膽

羊肝

入脾  
陰

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

外候。膽之精華也。故謂膽者。治目病。膽月取。膽  
 膽十餘枝。以定黃。滿紙套。龍佳。懸。鹿。下。待。出。搗  
 下。膽之神効。各二百味。草花。年。骨。則。止。補。骨。燒。灰  
 膏。以。年。食。百。黃。蜂。採。百。花。也。年。骨。則。止。補。骨。燒。灰  
 擦。牙。則。止。四。腎。年。精。年。服。則。止。潤。膚。澤。肌。年。血。則  
 止。解。此。研。諸。毒。外。衰。六。凡。服。丹。石。人。忌。食。年。血。土  
 水。銀。輕。粉。生。銀。礪。砂。洗。霜。硫。黃。乳。石。鍾。乳。年。乳。則  
 空。青。甘。青。緩。母。石。陽。起。石。孔。公。葉。等。毒。年。乳。則  
 止。潤。燥。消。滯。年。續。則。止。敷。疔。瘰。瘡。而。於。氣。血。未。有  
 補。豈。有。年。肉。一。味。功。能。入。肺。補。氣。而。於。形。血。精。液  
 竟。不。補。及。者。乎。但。其。氣。薄。於。血。則。雖。日。服。甘。肥。而  
 血。不。生。血。薄。於。氣。則。雖。日。服。參。耆。而。氣。不。長。於。此

本草求真 卷一 平補年肉



是以虛勞藥不難進以吐紅痰病用此往往獲效  
義由於此然使火勢急迫則又當用至陰重劑以  
爲拯救不可恃此輕淡以爲扶衰救命之本而致  
委靡自失耳

蠟二十八  
加生

蠟出入  
肝脾本有二一出於蜂蜜之滓而成卽蜜凝結  
之粗者也其蠟有黃有白一出於樹之蠟其蠟由  
木之虫而得故又名虫白蠟白蠟  
有二二者氣味不同  
性亦微別如蜜蠟味淡性平其蠟木由窠成窠本



潤物則蠟亦潤故能主潤臟腑經絡而有絕續補

傷生肌之妙甄權治孕婦胎動下血不絕飲死以

立蠟止存窠粗和其性最濡故又能止瀉絕痲

治府有調氣飲千金治痲有眼蠟湯華陀治下府

食人而吐用白蠟方寸匙鷄子黃一枚石蜜苦酒

髮灰黃連末各半鷄子殼先煎蜜蠟苦酒鷄子四

味令勻乃飭連末灰髮熬至可光乃止二日服盡

效今人以情不投而曰嚼蠟即味淡之意也又凡

蕩除下焦之藥以此製丸亦其免傷上部之意窠

蠟之用如此至於虫蠟係生蠟樹所產蠟樹屬金

性最堅強虫食其葉而成味甘氣溫按甘益血補

中濕能通經活絡故膏職能止痛生肌補虛絕續  
與桑螵蛸同有補虛之意可為外科聖藥是以如  
骨實云江御章尿血用白蠟加於涼血滋腎藥中  
遂愈又書云用此合合獸皮同入長肉膏中神效  
又治下疳服之未成即消已成即斂以半兩入御  
魚腹中煮食治腸紅神效則知虫蠟亦皆生肌活  
血之味但蜜蠟味甘淡清穢溫虫蠟則味甘不淡  
而溫也蜜蠟因有滯性可以止瀉治痢虫蠟清性  
差減而痢則解用也蜜蠟本於蜂蜜之氣僅得甘

之餘氣而成而所主在胃虫蠟得樹收斂堅強之  
氣而所治專在筋肉骨血也二者微似之中恍惚  
之際不可不知

本草求真卷一

補火按李時珍云命門為精作原之物其體非  
大下通二腎上通心膈為生命之原相火之  
主精氣之府人物皆有生人生物俱由此出又按  
在昂謂人無此火則神機滅息生氣消亡趙養葵  
謂火可以水折惟水中之火不可以水折故必擇  
其同氣引歸宅則火始不上浮而下降矣此火  
之所由補也第世止知附桂為補火之畏硫黃為  
火之精越外毫計及更不知其附桂因何相需  
必用詎知大衰氣寒而厥則必用仙茅火衰則必用  
寒腹惡則必用肉桂火衰寒結不解則必用硫黃  
既黃火衰冷痺精遺則必用以仙茅火衰痼疾以

本草求真

卷一 補火附子

三十八

江西撫州府清江縣人  
清江縣人  
清江縣人  
清江縣人

降則必用胡巴火衰氣逆不歸則必用以沉香  
 火衰腎泄不固則必用以補骨脂火衰陽痿血寒  
 則必用以錫起石火衰風冷痿痺則必用以淫羊  
 蕪火衰風濕瘰癧則必用以蛇床子火衰腦寒  
 生則必用以川椒火衰氣逆呢起則必用以丁香  
 火衰精澁不攝則必用以益智至於陽不道督類  
 用鹿茸以補之火不交心須用遠志以通之水厥  
 不開須用鍾乳石以利之氣虛喘乏須用蛤蚧以  
 禦之精滑不禁須用附子氣虛以補之皆當隨症酌  
 與不可概用若使水火並衰及或氣陷不同陰精  
 獨勝尤當切禁

附子  
二十九  
 草

附子命門入味辛大熱純陽有毒其性走而不守  
 古  
 其性走而不守非通行十二經無所不至為補  
 若乾甚止而不行

先天命門真火第一要劑凡一切沉寒痲冷之症

用此無不奏效

吳綬曰附子乃陰症要藥凡傷寒

而脉沉者必用之或厥冷腹痛厥沉細甚則肩背

功近世陰症傷寒往往疑似不飲川附子益持陰

極陽竭而用之已遲矣且夾陰傷寒內外皆陰陽

氣順衰必須急用人參以益其原佐以故書皆載

能治寒毒厥逆書曰陰陽不相應接謂之厥又曰

之謂也凡厥有陽有陰但察傷寒初起頭痛發熱

惡寒後則四肢厥冷乍溫大便燥實諸證發渴熱

手擲足不惡寒但惡熱脉來沉滑而數重按有力

是為陽厥宜用承氣白虎等湯以治若初起並無

瓜用清熱飲引衣被料二便猶利不消或腹痛泄

霍亂轉筋拘攣風痺癥瘕積聚督脈為病脊強面	脈虛乎無悞江昂云脾泄命火不足冷痢寒濕	虛寒色之紅赤而澤者為實熱能合色	小無力嘔吐清水當作寒醫色之黃白而枯者為	士材又謂但察脈大有力嘔吐酸臭當作熱治	反胃歷考諸書皆以噎膈為有火反胃為無火而	下頁久吐是稿在於幽門胃之下口其症謂膈食	須臾吐出是稿在於贛門胃之上口其症謂噎食	喉印返是稿在於吸間脈會其症謂噎食下胃	深者必利後噎氣虛寒而噎者經曰病膈噎膈泄	有吐利後噎氣虛寒而噎者經曰病膈噎膈泄	野發而噎有陰寒宜中於胃而致氣不克舒而	內寒迫其相火上衝而噎有偶發生冷陽氣不	以治呃遊嘔噎噎心而致氣逆而呃有陽氣衰	逆湯呃遊嘔噎噎心而致氣逆而呃有陽氣衰	逆脈來沉細無力方謂陰厥宜用附子理中湯	和清表或真凍何如刃割厥宜用附子理中湯
---------------------	--------------------	-----------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

厥小兒慢驚癩瘡灰白癩疽不飲皆屬於其虛

氣藥中則追失散之元陽人發散藥中則能開腠

理以逐在表之風寒入溫煖藥內則能以祛在裏

之寒濕虞獨書所云入補血藥則能以滋不足之

真陰緣陰與陽相為依附補陽即所以滋陰若使

水虧火盛用以辛熱純陽不更使火益盛而水益

虧乎好古曰非身涼而四肢厥逆者不故崔氏八

味丸中用此以為補陰嚮導使陰從陽復然丹溪

謂其雄悍無補而且殺人其言似謬制府都昌上

本草長真 卷一 補火利子 四十一



他病日以附子煎湯飲兼明使黃如此數世新州

衛張百斤平生服鹿茸附子集至八十歲康倍

常宋張景賢說鹿茸附子集至八十歲康倍

附湯吞硫黃金液丹百粒乃能健咳否則倦弱不

支壽至九十他人服之一粒即為害若此數人者皆

其臟腑稟賦之偏服之有益無害不可以常理推

論但陰極似陽服之不宜熱投虛陽上浮治之以

寒則除氣益甚而病增治之以熱則拒格而不納

熱藥冷飲下咽之後冷體既消熱性便痰而病氣

隨愈不違其情而致發散附子須生如四逆湯生

火益此反治之妙也仲景麻黃附子細辛以四逆

類用補附子宜熟如仲景麻黃附子細辛以四逆

彰明赤水產者為最皮黑體圓底平八角重三兩

者良冰浸麴畏煨命發拆乘熱切片反牛夏烏頭

附子

天雄

附子

之川附子性輕逐風不似附子性重逐寒烏附尖能

吐風痰以治癩癩取其直達病所常山吐痰痰積

子吐氣痰在腦參虛吐虛痰烏附尖蒸瘧吐風痰

天雄細長獨將無附其身大於附子其尖向下能

補下焦命門陽虛然辛熱走竅止鶴主治風寒濕

痺之品側子連生附側宜於發散四肢故治手足

風濕諸痺其功皆與附子補散差殊畏人參黃耆

甘草防風犀角紫豆童便及貝母半夏括蕪白芩

白蠟中其毒者黃連犀角甘草節煎湯解黃土水

亦解

仙茅

三十一  
山草

仙茅

音人  
命門

辛熱微毒據書皆載功端補火助陽煖

精凡下元虛弱陽衰精冷失溺無子並腹冷不食

冷痺不行廢不服之有效以其精為火宅火衰則

精與血皆衰而精自爾厥逆不溫溺亦自爾失候

不禁矣此與附桂硫黃胡巴破故紙淫羊藿蛇床

子遠志同為一例但附子則能以除火衰寒厥肉

桂則能以通血分寒滯胡巴則能以除火衰寒厥

孫炎撰  
藥除神

獨年荏則能以除火衰風冷蛇戾子則能以祛火  
 衰寒濕疏黃則能以除火衰寒結破故凝則能以  
 理火衰腎海遠志則能以除火衰怔忡雖其所補  
 則同而效各有攸建未可云其補火而不分其主  
 治於其中也故凡火衰病見川之不離附桂餘則  
 視症酌增然亦須視稟賦素怯則宜沈括筆談云  
賦乳於人但輕則身冷如逝者既覺須令人溫之  
其久乃能動常服仙茅鐘乳破黃莫知犯極此稟  
賦素怯若相火熾盛服之反能動火為害叵測果  
則宜老說云一人中仙茅黃舌服出口漸大與肩齊因  
 以小刀剪之隨破隨落至百數始有血一照出日

之... 名...

可拔矣... 然川產者少... 惟先者... 不可... 確屬之無官也

辨以竹刀刮切糯米泔浸去赤汁酒并濕蒸勿犯

鐵器

葫巴 三十一

葫巴 命門 苦溫純陽亦能入腎補命故書栽暖

丹田壯元陽治腎臟虛冷並疝瘕冷氣小腸偏墜

寒濕脚氣 時珍曰 葫巴有腎命門藥也元陽不

和劑局方有葫巴丸治大人小兒小腸疝氣

及小腹有形如卵上下走痛不可忍者用葫巴

巴入錢首香六錢巴戟去心川烏頭泡去皮各二

錢揀貴去枝四錢吳茱萸五錢並炒為末酒糊丸

補丸  
除却

悟子大每服五九蓋酒下功與仙茅附子硫黃恍惚相似然  
其力則終遜於附子硫黃故補火仍須兼以附硫

茴香吳茱萸等藥同投方能有效係海外胡蘿子

因聲音相近故名酒浸暴乾炒用

淫羊藿 三十二  
山草

淫羊藿 崑崙入命門兼入肝腎 辛香甘溫諸書皆載能治男子

絕陽不興女子絕陰不產且能治冷風勞氣四肢

麻木不仁腰膝無力時珍曰淫羊藿味甘氣香性

明三焦命門藥也 蓋因氣味甘溫則能補火助陽

本草求真 卷一 補火 胡巴 淫羊藿 四十二

兼有辛香則冷可除而風可散耳至云久服無子

恐其陽旺多慾精氣耗散無他故也欲景日滿佳

食此去枝年脂拌炒山藥為使得酒頁

蛇床子三十二芳草

蛇床子命門人辛苦性溫功能人腎補命祛風燥濕

故凡命門火衰而致風濕內漸病見陰痿蛇床子

兎絲子等分為囊濕及女子陰戶虫蝕兩白蛇床子

錢煎湯子臟虛寒取蛇床子仁為末入白粉產門

不閉暨腰痠體痺帶下脫肛脫肛以蛇床子甘草

補風

敷與夫一切風濕疥癬等病。錢床子一兩輕粉四錢爲細末油調抹服之則陽莖舉關節利腰背嘔手足遂瘡疥搯至於大瘋身癢難當作湯浴洗產後陰脫不收用此細袋熨收但性溫燥凡命門火熾及下部有熱者切忌惡丹皮貝母巴豆去皮殼取仁微炒

遠志

三十四山草

遠志

諸人

辛甘而溫入足少陰腎經氣分強志益

精凡夢遺善忘喉痺失音小便赤澀因於腎火衰薄而致者宜用是藥以補益精與志皆藏於腎腎



氣充則九竅利智慧生耳目聰明邪氣不能為害

腎氣不足則志氣衰不能上通於心故迷惑善忘

時珍曰遠志入足少陰腎經非心經藥也其功專

於強志益精治善忘益精與志皆腎經之所藏也

腎精不足則志氣衰不能上通於心故迷惑善忘不能

不固也昔人治喉痺失音作痛喉火衰遠志末吹之

涎出為度非取其通腎氣而開竅乎一切癰疽背

發從七情憂鬱而得單煎酒服其渣外敷投之皆

愈非苦以泄之辛以散之意乎小便赤濁用遠

志甘草茯苓神益智為丸棗湯服効非取遠志歸陰

本草

補火  
除分  
寒帶

以為嚮導之藥乎。但一切陰虛火旺便濁遺精咳

痺癰腫慎勿妄用去心用甘草水浸一宿暴乾焙

乾用教曰凡使須去心否則令人煩悶苗名小草亦能利竅兼散

少陰風氣之結也長珍珠藜蘆得挾苓龍骨良

肉桂三十五  
香木

肉桂門人命氣味純陽辛甘大熱直透肝腎血分

大補命門相火相火即兩腎中之真火先天之祖

入胃全在益陽治陰趙養葵云益火之原以消凡

此為蒸騰陰翳入味地黃丸是也沉寒痼冷管衛風寒陽虛自汗腹中冷痛欬逆結

本草求真 卷一 補火建志肉桂

四十五

保國書

氣脾虛惡食濕盛泄瀉

時珍治寒痺風濕陰虛失血瀉痢皆取辛泄散

結之力也古方治小兒驚癇及泄痢病方五苓散

以瀉可火滲土濕內有桂枝抑肝風而扶脾土引利

水藥入血脈不通死胎不下西桂辛散能通子宮而破血調經目

赤脈痛因寒因滯而得者用此治無不效蓋因氣

味甘辛其色紫赤有鼓舞血氣之能性體純陽有

招導引誘之力昔人云此體氣輕揚既能峻補命

門復能竄上達表以通營衛非若附子氣味雖

辛復兼微苦自上達下止固真陽而不兼入後天

之用耳故凡病患寒逆既宜溫中及因氣血不和

欲其鼓舞

起必用

則不必用附子慎以峻補血氣

之內加以肉桂以為佐使如十全大補人參養營  
之類用此即是此意。今人勿細體會徒以附桂均  
屬辛溫任意妄投不細明別豈衛生救本辨藥者  
所應爾爾歟。但精虧血少肝盛火起者切忌桂山  
嶺南色紫肉厚體鬆皮嫩辛甘者佳得人參良忌  
生慈石脂列入藥勿見火

沉香

三十六  
香木

沉香

崑崙入命門  
兼入脾

辛苦性溫。體重色黑落水不浮故

補火降

書載能下氣。墜痰。氣香能散。故書載能入脾。調性。

色黑。體陽。故書載能補火。煖精。壯陽。是以心腹疼。

痛。禁口。逆痢。癰癤。邪惡。冷風。麻痺。氣痢。氣淋。冷字

宜能審其病因。屬虛。屬寒。俱可用此。調治。益此。溫而。

不燥。行而不泄。同藿香。香附。則治諸虛。寒熱。並婦。

人。強忍入房。或過忍尿。以致胞轉。不通。同丁香。肉。

桂。則治胃虛。呃逆。同紫蘇。白豆蔻。則治胃冷。嘔吐。

同茯苓。人參。則治心神不足。同川椒。肉桂。則治命。

門火衰。同肉蓯蓉。麻仁。則治大腸虛秘。古方四種。

似沉香化氣北溪痰丸用之取其降泄也沉香  
 氣散用之取其散結導氣也黑錫丸用之取其納  
 氣歸元也但降多升少氣虛下陷者切忌色黑中  
 實沉水者良教曰沈於水下者為上香甜者性平  
 辛辣者熱入湯劑磨汁用入丸散紙裝置懷中待  
 燥碾之忌火

硫黃 三十七  
石

石硫黃 前人命門玄壽先生曰硫是礬之流礬是  
欽之精磁石是欽之母故鐵磁石出  
 硫黃立味酸有毒補曰有大毒以大熱純陽號為  
 成紫粉

火精時珍曰凡產夜破黃處益人一身全賴命門

真火周佈始能上貫心肝以主云為中及脾胃以

蒸水穀下司開闔以送二便旁達四肢以應動後

李時珍曰命門為蒸精係胞之物其體非脂非肉

白膜裹之在脊骨第七節兩腎中央系著於脊下

通二腎上通心肺其腦為生命之原相火之主精

氣之府人物皆有之生人生物皆由此出即經所

謂七節之旁中有小心是也以此火既衰陽微陰

相能代心君行事故曰小心也

盛內寒先生外寒後中厥氣逆胸旁及於脾胃為

腎關外寒斷關並入由是無熱惡寒手足厥逆二

便凝結難以機搯致下猪澤溼利則二便不通

凝結益甚。是猶竹冰不解。非不補火消陰。疎陽。胃則寒。莫去而結。莫消。書云。命門火衰。服附桂不能補者。須服硫黃補之。按硫黃純陽。與大黃一寒一熱。並號將軍。凡陽氣暴絕。陰毒傷寒。久患寒瀉。脾胃虛寒。命欲垂盡者。須用此主之。又治老人一切風秘。冷秘。氣秘。熱藥多泄。惟黃連肥腸而止瀉。熱藥多秘。惟硫黃緩而能通。為補虛助陽聖藥。且能外殺瘡疥。一切虫蠱惡毒。並小兒慢驚。婦人陰蝕。皆能有效。但必製造得宜。始可以服。余用法集。另詳雜症。凡遇一切虛癆中。



寒冷痢冷痛四肢厥逆并面赤戴陽六脈無力或

細數無倫煩燥欲卧井中口苦咽乾漱水而不飲

啣審屬虛火上浮陽酸陰格者服無不效王好古曰如左

白丹來復丹皆用硫黃佐以硝石至陽佐以至陰

與仲景白通湯佐以人尿猪膽汁大意相同所以

治內傷生冷外日暑熱霍亂諸病能去格拒之寒

兼有伏陽不得不爾如無伏陽只是陰虛更不必

以陰藥今人不曉病機一見秘結不解不分寒熱

性之概用承氣以投詎知寒熱不同冰炭迥異用之無

益適以致害可不慎歟但火極似水症見寒厥不

細辨認輒作寒治遺用此藥其害匪淺孫升談類云硫黃

生黃

陽起石三八

辛熱腥臭止可入瘡藥不可服研黃用大腸衣製其法不佳

仙藥也每歲三伏日餌百粒去臟腑積滯有驗但  
硫黃伏生於石下陽氣溶波凝結而歸其性大熱  
火煉服之多發背疽方寸泊宅編云金液丹乃硫  
黃煉成純陽之物有痼冷者所宜今夏至人多服  
之反為大患韓退之作文戒服食而晚年服硫黃  
而死可不戒乎夏英公有冷痢服硫黃鍾乳莫之  
紀極竟以壽終此許顏色黃堅如石者良土硫黃  
其藥受與人異也

陽起石命門人即雲母根也雖大雪遍境此山獨無

稟純陽之氣以生味鹹氣溫無毒能補命門相火

凡因火衰寒氣內停宿血留滯而見陰痿精滑子

本草求真 卷一 補火 硫黃 陽起石 四七

腎虛冷腰膝冷痺水腫瘕瘕服此即能有效

性稟純陽者故耳是以育龜丸用此以為嗣續

桃之基陽起石合石龍子蛤蚧生犀角生附子其

為末生鱈魚血為丸硃砂不可切衛論也功

類於硫黃但硫黃大熱號為火精此則其力稍遜

而於陽之不能起者克起陽起之號於是而各出

齊州雲頭兩脚鷲鷓毛色白滋潤者良火煨醋淬

七次研粉水飛用宗與曰石藥冷熱桑螵蛸為使

惡澤瀉茵桂雷丸石荊蛇皮惡兔絲忌羊血不入

湯劑

石鐘乳

三九

石鐘乳

大腸人胃

即鷲管石者是也味辛而甘氣溫

質重故比欬氣上逆脚弱冷痛虛滑遺精陽事不

舉者服此立能有效以其氣不歸元壅堅鎖虛得

此火不上浮氣不下脫而病俱可以愈耳且以辛

溫之力又兼色白故能通竅利乳昔人取名鐘乳

即是此意但金石性悍服之陽氣暴充形體壯盛

飲食倍進得此肆溢則精竭火燥候為癰疽淋濁

經時以  
此通發  
初水

審不勝言。即古有焚香透膈散。川雄黃佛耳草款冬花安並香燻以

人疾以治胸膈勞嗽痞滿之病。然暫用則可久

用恐損人氣。出洞穴中石液凝成。下垂如水柱。通

中極薄如鶩翎。管碎之。如瓜甲。光明者。真煉合各

如本方。蛇床為使。惡牡丹。畏紫石英。忌參朮。羊血

葱蒜胡荽

鹿茸四卜

鹿茸尚入命門甘鹹氣溫。稟純陽之質。含發生之

氣。號為山獸性。活而遊山。夏至得陰氣。而角解。隨

補腎水  
以助

補腎  
以助

生陽退之象也。至於六於鹿者，為麋。麋是澤獸，陰性，濡而遊澤。冬至得陽氣，而角解，陽生陰退之象也。陰陽相反如斯，故鹿氣味純陽，其性能於右腎補其精氣不足，大為補精煖血之劑。是以書載能補髓養血，強筋健骨，凡腰腎虛冷，遺精崩帶等症，服皆有效。麋雖屬陰，而茸又屬陰中之陽，故能入於左腎，補其血液不足。且諸茸皆發督脈之背，鹿鼻常反向尾，能通督脈，其華在角。督為腎臟外取以補命門，補精補氣，皆以養陽也。督為腎臟外垣，外垣既固，腎氣內充，命門相火不致妄動，血氣

精津得以凝聚故鹿茸又云能補督脈之真陽糜  
茸能補督脈陰中之陽不可不細為明辨耳但鹿  
茸與麋世罕能辨大抵其質粗壯者骨堅厚毛色  
蒼黑而雜白毛者則為麋茸形質差瘦腦骨差薄  
毛色黃澤而兼白毛者則為鹿茸麋鹿雌分有二  
然總不外填補精髓堅強筋骨長養氣血而為補  
肝滋腎之要藥也鹿一牡常御百北是腎氣有陰  
而足於精者也故有助陽扶陰  
之鹿角初生長二三寸分岐如鞍紅如瑪瑙彼之  
如朽木者夏酥塗微炙用茸有小白虫視之不見

為破恐出入身

鯨四十一

鯨 龍入心 味最甘 唐品所尚 然性華跳躍 風火易

動 是以書載小兒切勿妄食 恐其發驚動氣也 陰

虛火動者尤忌 以其性易泄陰也 惟乳汁不下及

風痰不吐 與制藥壯陽為差 宜耳時珍曰 時猪肉

游馬種亦鯨屬 雖加勿離首類 馬身似鯨浮於水

而亦主下胎催產及佐房術之用也

蛤蚧四十一

本草綱目卷之二十一 鱗部 蛤蚧 五十一



之相

蛤蚧崑山人命絕與蛤蚧不類生於浙南身長七寸首如蟾蜍皆綠色斑頭圓肉漸鱗小而厚鳴則上下相呼雌雄相應情洽乃交而相抱負自墜於地往捕斃之至死不閉大助命門相火故書載為房術要藥且色白入肺功兼入參羊肉之用故用能治虛損痿弱消渴喘嗽肺癆吐沫等症專取交合肺腎諸氣入藥去頭留尾酥炙口含少許雖疾走而氣不喘則知益氣之功為莫大焉但市多以龍子泥背舉世亦不深辨如龍子則剖開而身乾

赤斑皮崩助陽火雖治陽痿性少止瀉蛤蚧則纏  
 束多對通身白鱗兼溫肺氣故肺虛喘乏最宜  
 喘嗽  
 勿用其藥不論牝牡皆可即非相抱時捕之功用  
 亦同但其藥力在尾見人捕之尾不全者不效去  
 頭尾因勢在眼須去其頭洗去鱗肉不淨乃肉毛酥矣或家  
 多或海浸焙用

雄蟹蛾

四十三 那生

雄蟹蛾

命婦入

即二蟹所出之雄者也味鹹性溫其

性最溫出齒便婦諸書皆載能起陰痿益精強志

飯於生有交接不倦并敷諸瘡或極止尿血煖腎  
 蓋取其性溫助陽氣入腎之功耳是以千金方  
 治丈夫陰痿不起用此一夜每服一丸可御數女  
 以蠶蛾二升去翅足微火灼黃以葶藶止之但  
 為末蜜丸如梧桐子大酒下  
 止為陽痿求嗣而見若使陰虛火盛而用此為溫  
 澀之術則陰愈竭而火益盛欲不速斃其可得乎  
 故古補方多不具載恐人藉此以為斷喪之具也  
 取未交雄者佳糞退紙燻灰可敷走馬牙疳  
 入麝和蜜敷走馬牙疳  
 牙疳如白紫者并治邪祟發狂悲泣  
 卷一